

6 ? ASCOPHYLLUM STACKH.

Dans mes « Remarques sur la nomenclature générique des Algues » (Mém. soc. sc. natur. Cherb. T. IV, pp. 81 et 82), j'ai montré la nécessité d'adopter les trois genres *Bifurcaria*, *Ascophylla* et *Hydrolapatha*, établis par Stackhouse dans son « Tentamen marino-cryptogamicum. » Toutefois, la désinence de ces deux derniers noms ne saurait être conservée telle qu'elle a été écrite par Stackhouse ; et, à mon avis, l'on doit dire *Ascophyllum* et *Hydrolapathum*.

- A. nodosum** (LIN.) LE JOL. Alg. mar. Cherb. n° 101. — *Ascophylla lævigata* STACKH. Tentam. p. 66 [1809]. — *Ozothallia vulgaris* DCNE et THUR.; KTZ. Spec. alg. p. 591. — *Fucus nodosus* LIN.; HARV. Phyc. brit. pl. 158 ; LLOYD Alg. de l'Ouest, n° 120. — *Fucodium nodosum* J. AG. Spec. alg. I, p. 206 ; CROUAN Alg. Finist. n° 100 ; HOHENACK. Alg. mar. sicc. n° 30.

Rochers à mi-marée. Fruct. hiver. — CC.

7 ? CYSTOSIRA AG.

- C. ericoides** (LIN.) AG.; J. AG. Spec. alg. I, p. 221 ; HARV. Phyc. brit. pl. 265 ; CROUAN Alg. Finist. n° 108 ; LLOYD Alg. de l'Ouest, n° 79, 198 ; LE JOL. Alg. mar. Cherb. n° 25. — *Halerica ericoides* KTZ. Spec. alg. p. 594.

Sur les rochers, à basse mer. Fruct. printemps. — C.

- C. granulata** (LIN.) AG.; CHAUV. Alg. Norm. n° 25 ; HARV. Phyc. brit. pl. 60 ; J. AG. Spec. Alg. I, p. 217 ; CROUAN Alg. Finist. n° 107 ; LLOYD Alg. de l'Ouest, n° 18 ; LE JOL. Alg. mar. Cherb. n° 126. — *Phyllacantha granulata* KTZ. Spec. alg. p. 596.

Dans les flaques, à mi-marée. Fruct. hiver. — CC.